


إبقاء الطالب المصاب بأعراض كوفيد - 19 في المنزل

اي اعراض عالية الخطورة لـ كوفيد - 19



سعال جديد



درجة الحرارة
100.4 درجة
غهرنهايت او اعلى



فقدان جديد للطعم
أو الرائحة

OR

- اثنتين او اكثر من اعراض كوفيد - 19 منخفضة المخاطر



احتقان أو سيلان
الأنف



صداع الراس



آلام العضلات أو
الجسم



التهاب الحلق



التعب الجديد أو
المتفاقم



الغثيان أو القيء
أو الإسهال

الحصول
على اختبار
كوفيد
19 -
الفيروسي

إبقاء الطفل في المنزل حتى يتم -: استيفاء المعايير التالية

اختبار إيجابي	تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة العامة المحلية
النتائج المعلقة	حتى تُعرف النتائج
اختبار سلبي	او اكثر ساعة بدون 24 حمى وتحسن الأعراض
لم تختبر	بعد 10 أيام من ظهور الأعراض و 24 ساعة او اكثر بدون حمى وتحسن الأعراض
التشخيص البديل	ساعة او اكثر 24 بدون حمى وتحسن الأعراض

إبقاء الطفل في المنزل حتى يتم -: استيفاء المعايير التالية

تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة العامة المحلية

لا يُنصح بإجراء الاختبارات الروتينية للأطفال الذين لا يعانون من أعراض والذين يعانون من التعرض المعروف لـ كوفيد - 19

احتفظ بالطفل في المنزل مع التعرض لـ كوفيد - 19



يتم تحديد التعرض من قبل وزارة الصحة العامة محلية

على سبيل المثال: في نطاق 6 أقدام من شخص مصاب لمدة (15 دقيقة على الأقل)

اختبر فقط
إذا كان
هناك
أعراض